TUGAS LAB ACT PATOLOGI ANATOMI HYPNOWRITING

Nama : Evita Rizky Amelia

NRP : 1810211108

Lab Act B-1

APA ITU SERVISITIS KRONIK?

Serviks itu sendiri merupakan bagian paling bawah dari rahim yang terhubung dengan vagina. Servisititis merupakan kondisi yang juga dikenal dengan infeksi atau peradangan yang terjadi pada serviks atau leher rahim yang terjadi secara tiba-tiba. Peradangan ini dapat ditandai dengan keluarnya darah dari vagina diluar periode menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual atau keluarnya cairan yang tidak normal dari vagina. Servisititis dapat disebabkan oleh penyebab infeksius maupun non-infeksius. Sebagian besar servisititis disebabkan oleh infeksi dari *Chlamydia* dan *Neisseria gonorrhoeae* yang dapat ditularkan dari hubungan seksual, sedangkan servisititis yang disebabkan oleh penyebab lain seperti alergi atau iritasi akibat tampon dan alat kontrasepsi disebut sebagai servisititis non-infeksi. Servisititis juga dapat meningkatkan resiko seorang wanita tertular HIV dari pasangan seksual yang terinfeksi penyakit tersebut.

Gambar 1. Perbedaan Serviks Normal dan Servisititis

(Sumber : <https://sandurezu.wordpress.com/2013/08/27/servisititis/>)

Ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya servisititis, antara lain:

- Berhubungan seks dengan banyak pasangan
- Aktivitas seks yang tidak aman; seperti tanpa menggunakan kondom
- Melakukan hubungan seks dengan seseorang yang beresiko tinggi
- Aktif melakukan hubungan seksual sejak usia muda
- Memiliki riwayat infeksi menular seksual

Terdapat 2 jenis servisis, yaitu servisititis akut dan servisititis kronik. Servisititis akut adalah servisititis infeksi pada serviks yang terjadi secara tiba-tiba akibat *Neisseria gonorrhoeae* sebagai salah satu infeksi hubungan seksual, sedangkan servisititis kronik adalah servisititis yang terjadi dan berkembang dalam waktu yang lama (menahun) dan sebagian besar dijumpai pada wanita yang pernah melahirkan. Servisititis kronik dapat terjadi akibat luka-luka kecil atau besar pada serviks karena keguguran atau melahirkan sehingga dapat memudahkan masuknya kuman-kuman ke dalam endoserviks dan kelenjar-kelenjarnya, lalu menyebabkan infeksi menahun. Jika kondisi ini tidak diobati maka servisititis yang terjadi akibat infeksi dapat menyebar hingga ke rongga perut, menyebabkan gangguan pada kesuburan dan masalah pada janin bagi ibu hamil.

Gambar 2. Perbedaan Servisititis Akut dan Kronik

(Sumber : <https://slideplayer.info/slide/13564571/>)

Servisititis merupakan penyakit yang perlu diwaspadai oleh wanita. Salah satu caranya dengan mengenali tanda dan gejala dari servisititis itu sendiri. Sayangnya, servisititis sering kali tidak menimbulkan tanda dan gejala apapun, sehingga penyakit tersebut baru akan diketahui ketika melakukan pemeriksaan panggul untuk alasan lain. Namun, bila menimbulkan gejala-gejala dibawah ini, maka sangat disarankan untuk menghubungi dan periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan secepatnya. Gejala servisititis dapat meliputi:

- Keputihan yang tidak biasa dalam jumlah banyak
- Terdapat cairan berwarna kuning keabu-abuan pucat dengan bau tidak sedap
- Sering buang air kecil dan terasa nyeri setiap melakukannya
- Nyeri saat berhubungan seksual
- Mengalami perdarahan diantara periode menstruasi
- Mengalami perdarahan vagina setelah berhubungan, dan tidak berkaitan dengan periode menstruasi
- Vagina terasa sakit
- Nyeri di panggul atau perut
- Demam

Peradangan pada serviks dapat menjadi lebih parah jika berkembang lebih lanjut, yang ditandai dengan terbentuknya luka terbuka atau keluarnya cairan dari vagina berupa nanah.

Untuk mendiagnosis dari servisititis diperlukan beberapa pemeriksaan, seperti:

1. Anamnesa

Pada umumnya servisititis bersifat asimtomatik atau tidak bergejala, namun apabila bergejala maka akan didapatkan keluhan berupa peningkatan jumlah discharge atau keputihan dari vagina yang berbau tidak sedap.

2. Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik, diperlukan pemeriksaan serviks menggunakan inspekulo untuk melihat adanya discharge mukopurulen (nanah), pembengkakan pada serviks, bercak kemerahan pada serviks, ulserasi, dan leukoplakia atau bercak putih atau abu-abu yang terlihat pada serviks.

Gambar 3. Discharge Normal

(Sumber: https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/380f0b7286211bf15ffb69f9f995307a.pdf)

Gambar 4. Discharge Mukopurulen

(Sumber: https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/380f0b7286211bf15ffb69f9f995307a.pdf)

3. Pemeriksaan Penunjang

➤ Pap Smear

Pemeriksaan pap smear dilakukan dengan mengambil mukus atau cairan dari serviks penderita sesuai prosedur. Pengambilan swab serviks dilakukan ketika wanita yang akan diperiksa tidak dalam keadaan menstruasi dan tidak melakukan hubungan seksual minimal 3 hari sebelum pemeriksaan.

Kegunaan diagnostik sitologi pap smear:

- Mendiagnosis peradangan
- Mendiagnosis kelainan pra kanker dan kanker
- Evaluasi sitohormonal
- Identifikasi organisme penyebab peradangan
- Memantau hasil terapi

Gambar 5. Pengambilan Mukus Serviks

(Sumber: https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/380f0b7286211bf15ffb69f9f995307a.pdf)

Servisititis dapat disembuhkan dengan melakukan pengobatan yang tepat berdasarkan penyebabnya. Bila servisititis disebabkan oleh reaksi alergi terhadap produk seperti spermisida atau produk kebersihan wanita, biasanya kondisi tersebut tidak memerlukan perawatan. Namun, servisititis yang disebabkan oleh klamidia, gonore, atau infeksi trikomoniasis membutuhkan antibiotik. Karena antibiotik dapat membunuh semua bakteri yang berbahaya maupun yang bermanfaat dalam vagina dan rahim, juga mengurangi kekebalan vagina, pasien sebaiknya tidak menggunakan antibiotik terlalu banyak. Obat antivirus dapat membantu mengobati jika penyebabnya adalah virus. Namun, obat ini tidak dapat menyembuhkan infeksi virus. Obat ini hanya bekerja untuk mengontrol dan mengurangi gejala.

Servisititis dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu:

- Hindari pemakaian produk-produk kewanitaannya yang mengandung parfum. Hal ini dikarenakan produk kewanitaannya yang mengandung parfum dapat menyebabkan iritasi pada bagian kewanitaannya maupun serviks
- Mempraktekkan hubungan intim yang aman. Seperti tidak berganti-ganti pasangan atau menggunakan pengaman (kondom) pada saat berhubungan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi seksual, seperti klamidia, gonore, herpes simplex, HIV, dan HPV.
- Jangan menggunakan obat-obatan tanpa anjuran dokter.
- Jangan mencuci vagina menggunakan sabun. Diskusikan dengan dokter untuk mengetahui metode dan jenis produk yang cocok untuk digunakan
- Lakukan pemeriksaan *pap smear* secara teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, Karlina. 2019. Mengenal Dampak Servisititis Kronis pada Fertilitas dan Kehamilan. <https://www.sehatq.com/artikel/perlu-tahu-ini-dampak-servisititis-kronis-pada-fertilitas-dan-kehamilan> (Diakses 18 Juni 2021)
- Teroes. 2019. What Is Cervisititis? <https://www.teroes.com/2019/04/what-is-cervisititis.html> (Diakses 18 Juni 2021)
- Joseph, Novita. 2020. Servisititis. <https://helohehat.com/wanita/penyakit-wanita/servisititis/> (Diakses 18 Juni 2021)
- Levani, Yelvi. 2017. Servisititis. <https://www.alomedika.com/penyakit/obstetrik-dan-ginekologi/servisititis> (Diakses 18 Juni 2021)
- Syandrez. 2013. Servisititis. <https://sandurezu.wordpress.com/2013/08/27/servisititis/> (Diakses 18 Juni 2021)
- Redaksi Halodoc. 2019. Servisititis. <https://www.halodoc.com/kesehatan/servisititis> (Diakses 18 Juni 2021)
- Redaksi Halodoc. 2018. Pengidap Servisititis Kronis Apakah Bisa Hamil? <https://www.halodoc.com/artikel/pengidap-servisititis-kronis-apaakah-bisa-hamil> (Diakses 18 Juni 2021)
- Makarim, Fadhli Rizal. 2020. Apakah Servisititis Termasuk Penyakit Berbahaya? <https://www.halodoc.com/artikel/apaakah-servisititis-termasuk-penyakit-berbahaya> (Diakses 18 Juni 2021)
- https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/380f0b7286211bf15ffb69f9f995307a.pdf (Diakses 18 Juni 2021)
- <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/149/jtptunimus-gdl-freyanazer-7420-3-babii.pdf> (Diakses 18 Juni 2021)